

## COSA FARE IN CASO DI TRAUMA DENTALE?

Il trauma dentale è una eventualità piuttosto frequente, soprattutto nei bambini più piccoli che stanno imparando a camminare. Alcune semplici accortezze al momento del trauma possono salvaguardare la vitalità del dente e semplificare la gestione della lesione in una fase successiva.

### COSA FARE SE IL DENTE È TRAUMATIZZATO SENZA DANNI APPARENTI?

---

Recarsi immediatamente dal proprio dentista, il quale esaminerà clinicamente e radiograficamente l'elemento dentale interessato.

### COSA FARE SE IL DENTE È FRATTURATO?

---

- Recarsi immediatamente dal proprio dentista
- Raccogliere il frammento di dente fratturato; se le condizioni lo consentono il dentista potrà riattaccarlo.
- Conservazione del frammento: il dente dovrebbe essere idealmente conservato in fisiologica sterile; in mancanza di questa conservarlo nella saliva del bambino o nel latte in un contenitore. NON conservare il dente in acqua.
- La tempestività d'intervento è fondamentale qualora la frattura esponga la polpa dentale (nervo, visibile come un puntino rosso sanguinante); la prognosi della vitalità del dente peggiora drasticamente all'aumentare del tempo di esposizione della polpa.

### COSA FARE IN CASO DI AVULSIONE (ESPULSIONE DEL DENTE DALL'ALVEOLO)?

---

- Raccogliere il dente avulso. Evitare di toccare la radice!!! NON pulirlo o lavarlo: si rischia di lesionare le fibre di attacco del dente.
- Conservazione del dente: il dente dovrebbe essere idealmente conservato in fisiologica sterile; in mancanza di questa conservarlo nella saliva del bambino o nel latte in un contenitore. NON conservare il dente in acqua.
- Recarsi con la massima urgenza dal proprio dentista: se le condizioni lo consentono potrà reimpiantare il dente avulso. È fondamentale il tempismo: oltre 1 ora la prognosi del dente reimpiantato diminuisce drasticamente.

### COSA FARE IN CASO DI LUSSAZIONE (IL DENTE SI È SPOSTATO DOPO IL TRAUMA)?

---

- Recarsi immediatamente dal proprio dentista, il quale esaminerà clinicamente e radiograficamente l'elemento dentario interessato.
- Il riposizionamento può essere effettuato immediatamente solidarizzando l'elemento avulso ai denti vicini. In alcuni casi questo non è possibile e il riposizionamento può richiedere terapie più complesse.

**Se avesse problemi e non riuscisse a mettersi in contatto con lo Studio, in caso di reale necessità, può telefonare al cellulare del dott Braga 347 2487005**